

Nachsorgeprogramm Rektumkarzinom UICC-Stadium II und III

Name:	PATIENTENAUFKLEBER	Diagnose:	
Geburtsdatum:		Therapie/ Operation:	

Nachsorgetermine <sup>1</sup>								
Posttherapeutischer Monat	3	6	12	18	24	36	48	60
CEA, klinische Untersuchung		•	•	•	•	•	•	•
Sonographie <sup>2</sup>		•	•	•	•	•	•	•
Coloskopie		• <sup>3</sup>	•					• <sup>4</sup>
CT Thorax Abdomen Becken	•			•				
Röntgen Thorax			•		•	•	•	•
Sigmoidoskopie/ Rektoskopie <sup>5</sup>		•	•	•	•			

<sup>1</sup> Eine Nachsorge wird nur durchgeführt, wenn bei einem Rezidiv therapeutische Konsequenzen zu erwarten sind.

<sup>2</sup> Bei schlechter Beurteilbarkeit der Sonographie kann ein CT alle 6-12 Monate erwogen werden.

<sup>3</sup> Falls präoperativ nicht vollständig erfolgt: Durchführung einer Koloskopie 3-6 Monate postoperativ. Dann Verzicht auf die Koloskopie in Monat 12.

<sup>4</sup> Komplette Koloskopie anschließend alle 5 Jahre bis zu einem Alter von 75 Jahren

<sup>5</sup> Nur wenn keine Exstirpation durchgeführt wurde bei Patienten mit erhöhtem Lokalrezidivrisiko: falls keine Radiochemotherapie durchgeführt wurde oder CRM+ oder EMVI oder cT4 oder cN2